



CONTROLESCHALEN

		Score	Kwalificatie
POS	Positieve beoordelingstendens	0	Zeer laag
NEG	Negatieve beoordelingstendens	2	Boven gemiddeld
BEO	Beoordelingstendens totaal	-2	Zeer laag
INST	Instemmingstendens	-0	Neutraal
MOM	Aantal "min of meer"	15	Gemiddeld
INC	Inconsistentie waarde	0	volledig consistent

HAP subschalen (% van maximaal haalbare score)



Normscores



INHOUDSCHALEN

		Score	Kwalificatie
SOC	Sociaal afzijdig Gedrag	7.6	Hoog
ONZ	Onzeker Gedrag	0	Laag
KWE	Kwetsbaar in de omgang	1.4	Zeer laag
SOM	Somatiserend Gedrag	-0.2	Zeer laag
WAN	Wanorderlijk Gedrag	2.8	Gemiddeld
RIG	Rigide Gedrag	2.6	Beneden gemiddeld
PERF	Perfectionistisch Gedrag	2	Laag
OMG	Moeilijk in de Omgang	11.8	Hoog
ZELF	Zelfingenomen Gedrag	5.6	Hoog
GRIL	Grillig en Impulsief Gedrag	9.4	Zeer hoog

**DSM-V persoonlijkheidsstoornissen**

De score geeft aan in hoeverre de antwoorden van de informant passen bij de persoonlijkheidsstoornissen. Dit is onderzocht in kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Een negatieve score geeft aan dat de antwoorden eerder in tegenspraak zijn met de stoornis. Een hoge positieve score geeft aan dat de antwoorden passen bij de persoonlijkheidsstoornis. Er kan dan sprake zijn van 'kenmerken' of een 'indicatie'.

Persoonlijkheidsstoornis	Indicatie	Score	Schaal (■ = gemiddelde)
Paranoïde	geen indicatie	-0.6	
Schizoïde	geen indicatie	+3	
Schizotypische	geen indicatie	+5.6	
Antisociale	kenmerken	+9.2	
Borderline	kenmerken	+7.2	
Histrionische	geen indicatie	+2.6	
Narcistische	kenmerken	+6.6	
Vermijdende	contra-indicatie	-6.4	
Afhankelijke	contra-indicatie	-8	
Dwangmatige	geen indicatie	+1	

**Factor Schalen**

In factoranalyse op de inhoudsschalen worden drie hogere orde factoren gevonden. Uit onderzoek is gebleken dat deze factorstructuur stabiel is in diverse doelgroepen. Op basis van de schaalscores kunnen individuele factorscores berekend worden. Een hogere score geeft aan dat de kenmerken meer van toepassing zijn. U ziet de ruwe en gecorrigeerde factorscores.

Normen Factorscores cliënten in zorg of behandeling (klinisch of ambuland)		Score	Kwalificatie	Percentiel
F1	Internaliserend / neurotisch	2.2	Beneden gemiddeld	30
	Gecorrigeerd	1.8	Laag	7
F2	Compulsief	0.5	Beneden gemiddeld	25
	Gecorrigeerd	0.5	Beneden gemiddeld	23
F3	Externaliserend / antagonistisch	9.8	Hoog	94
	Gecorrigeerd	9	Hoog	94
Normen factorscores voor niet-clënten (verzameld in wetenschappelijk onderzoek)		Score	Kwalificatie	Percentiel
F1	Internaliserend / neurotisch	2.2	Gemiddeld	47
	Gecorrigeerd	1.8	Zeer laag	5
F2	Compulsief	0.5	Laag	14
	Gecorrigeerd	0.5	Laag	12
F3	Externaliserend / antagonistisch	9.8	Zeer hoog	97
	Gecorrigeerd	9	Zeer hoog	96

**Neiging tot agressie** (aangetoond bij populatie psychogeriatricie)

Indicatie	Score	Schaal (■ = gemiddelde)
geen indicatie	15	

**Kenmerken van autisme** (aangetoond bij ouderen in de specialistische GGZ)

Geen indicatie.